

PODSTAWOWE INFORMACJE

Lek Disulfiram WZF (Esperal) działa do 12 miesięcy. W tym czasie obowiązuje **bezwzględny zakaz spożywania alkoholu**.

Zabieg implantacji Disulfiramu WZF ma charakter uzupełniający w leczeniu choroby alkoholowej. **Niezbędną podstawą skutecznego leczenia jest podjęcie terapii.**

Wykonanie zabiegu nie leczy z choroby alkoholowej oraz nie powoduje niechęci do alkoholu.

ZALECENIA PO WYKONANYM ZABIEGU




Dezynfekcja rany

Dwa razy dziennie dezynfekujemy ranę preparatem Octanisept, po czym zakładamy nowy opatrunek jałowy (7,2 cm x 5 cm)



Wersja ze szwami do zdjęcia


Po 10-14 dniach należy zgłosić się w celu usunięcia szwów (należy wcześniej umówić się telefonicznie). Jeżeli szwy zostaną ściągnięte poza naszym gabinetem - kontrola pozabiegowa będzie płatna 200 zł



Wersja PLUS ze szwami rozpuszczalnymi i antybiotykiem

Prosimy pamiętać, że szwy mogą rozpuszczać się do 4 tygodni.

PRZECIWWSKAZANIA PO ZABIEGU



Przez 10 dni nie wykonujemy ciężkich prac fizycznych, nie uczęszczamy na siłownię. Istnieje możliwość przesunięcia się leku z powięzi do tkanki podskórnej i powstania stanu zapalnego wraz z ropniem.



Do momentu zagojenia się rany obowiązuje zakaz kąpieli w stojącej wodzie (wannie, basenach, jacuzzi, otwartych zbiornikach wodnych). Zalecana kąpiel pod prysznicem bez opatrunku z użyciem naturalnych środków higienicznych. Następnie ranę osuszamy ręcznikiem papierowym i dezynfekujemy wg ww zaleceń.



Przez cały okres działania wszywki nie wolno używać/spożywać produktów lub kosmetyków zawierających w swoim składzie alkohol, takich jak:

- płyny do płukania jamy ustnej, płyny po goleniu (wybieramy te bez alkoholu)
- syropy, maści rozgrzewające (wybieramy te bez alkoholu)
- czekoladki i inne słodczyce z alkoholem
- perfumy (używamy tylko na ubrania)
- ocet w czystej postaci (ketchup, musztardę można w małych ilościach)



Kobiety, które zdecydowały się na zabieg muszą pamiętać, że nie powinny zachodzić w ciążę przez okres 12 miesięcy. **Informujemy, że nie wykonujemy deimplantacji.**

W razie zauważenie niepokojących objawów takich jak:

- wzmożony ból,
- wyczuwalna gułka w miejscu rany,
- zaczerwienienie,
- sączenie,
- powstanie ropnia itp.



należy pilnie skontaktować się z gabinetem Alkomedica!

W przypadku braku możliwości przyjechania na wizytę kontrolną do gabinetu, w którym wykonywano zabieg, należy zgłosić się do lekarza w miejscu zamieszkania* (opłatę za taką wizytę ponosi pacjent).

*dotyczy to także osób przyjeżdżających zza granicy tylko na zabieg.

Zapewniamy bezpłatną kontrolę do 30 dni po zabiegu. Po tym terminie kontrola płatna 200 zł

SKUTKI SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZY WSZYWCE

ZEWNĘTRZNE SKUTKI UBOCZNE

Skutki, które mogą, ale nie muszą wystąpić, ponieważ każdy organizm jest inny

- podwyższone ciśnienie
- zaczerwienienie, podrażnienie skóry
- bóle, zawroty głowy
- bóle brzucha
- przyspieszona akcja serca (kołatanie serca)
- nudności, wymioty
- lęk, zdenerwowanie oraz inne

WEWNĘTRZNE SKUTKI UBOCZNE

Nie są odczuwalne, natomiast następują po każdym spożyciu alkoholu

- zatrucie organizmu przez aldehyd octowy
- uszkodzenie wątroby
- uszkodzenie trzustki
- może dojść do zapalenia żołądka

Lek Disulfiram wchodzi w interakcje z innymi lekami. **Przed każdym zastosowaniem leków poinformuj lekarza prowadzącego o wykonanym zabiegu implantacji preparatu Disulfiram WZF.**

UWAGA: można przyjmować znieczulenie, np. u stomatologa.

Disulfiram nasila działanie: leków przeciwzakrzepowych, antypiryny, fenytoiny, chlordiazepoksydu i diazepamu. Amitryptylina i chlorpromazyna mogą nasilać, a diazepam osłabiać objawy tzw. reakcji disulfiramowej. Disulfiram hamuje reakcje utleniania i wydalanie ryfampicyny przez nerki.

Jednoczesne stosowanie izoniazydu i Disulfiramu może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego i wywoływać zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchów, drażliwość, bezsenność. Metronidazol i Disulfiram stosowane jednocześnie mogą wywołać stany dezorientacji i stany psychiatryczne. Nie zaleca się równoczesnego stosowania tych leków.

Kontakt z organicznymi rozpuszczalnikami zawierającymi alkohol, aldehyd octowy, paraldehyd podczas terapii Disulfiramem może wywołać reakcję disulfiramową.

Disulfiram może przedłużać czas działania alfentanilu.